


Oeverzwaluw

Riparia riparia (Zwaluwen)

L 12 cm | Sp 27-29 cm | langeafstandstrekker


Biotopoop Steile zandwanden, meestal in de buurt van water; voeragt in open terrein daaromheen.

- > broedtijd april-september
- > 4-6 zuiver witte eieren
- > 1-2 broedsels per jaar



40

Oeverzwaluwen broeden meestal in kolonies. Ze graven nestgaten in verticale zandwanden. Deze wanden zijn vaak tijdelijk van aard of juist speciaal voor hen aangelegd. De grootste kolonies zijn honderden, soms duizenden paren groot. Het broeden in steile wanden heeft als voordeel dat roofdieren zoals Vossen niet bij de nesten kunnen komen.



Geluid In de vlucht een vrij harde snorrende roep, 'tsjrrrt'. Onopvallende, kwetterende zang.




Boerenzwaluw

Hirundo rustica (Zwaluwen)

L 17-19 cm | Sp 32-34 cm | langeafstandstrekker

Biotopoop Broedt vooral in boerderijen en dorpen; voedselvluchten vaak boven grasland en natte gebieden.

- > broedtijd april-september
- > 3-6 witte eieren met bruinige stipjes
- > 1-3 broedsels per jaar



Geluid Roelt in de vlucht vaak 'witt', ook herhaald. Kwetterende zang, die vaak eindigt met trillers.

Roodstuitzwaluw

Cecropis daurica (Zwaluwen)


L 16-17 cm | Sp 32-34 cm | langeafstandstreker

Qua uiterlijk, leefwijze en nestplaats lijkt de Roodstuit-zwaluw wel op de Boeren-zwaluw. Roodstuitzwaluwen broeden vaker op natuurlijke rotswanden, maar ook wel tegen gebouwen. Het nest is gemaakt van leemklonters en stro en heeft een smalle tunnelvormige ingang. In Nederland is het een zeldzame maar jaarlijksse gast.


Geluid Als van Boeren-zwaluw, maar zachtere roep. Lagere en kortere, kwellerende zang.



Biotoop Broedt zowel in rotskloven als bij bewoning; zoekt voedsel in open terrein.
> broedtijd april-september
> 3-5 zuiver witte eieren
> 1-3 broedsels per jaar



41



Huiszwaluw


Delichon urbicum (Zwaluwen)

L 13 cm | Sp 26-29 cm | langeafstandstreker


Huiszwaluwen jagen meestal hoog in de lucht op kleine insecten. Ze vermengen de gevangen insecten met speeksel en voeren dat mengsel als balletjes aan de jongen.



Biotoop Oorspronkelijk een bewoner van rots-wanden, maar broedt nu vooral in dorpen en steden.
> broedtijd mei-september
> 3-5 witte eieren
> 1-2 broedsels per jaar



Geluid Roepit in de vlucht een droog 'tsjrip'. Zachte, kwinkelerende zang.



Inhoud

Dieren



Zoogdieren p. 14



Vogels p. 38



Reptielen p. 138

Amfibieën p. 144



Vissen p. 152



Insecten, spinnen en andere geleedpotigen p. 170

Slakken, schelpdieren en dergelijke p. 276

Zo gebruikt u dit boek p. 6

Overzicht van kenmerken: dieren p. 8

Overzicht van kenmerken: planten en paddenstoelen p. 10

Register p. 522

Symbolen en afkortingen p. 544

Planten en paddenstoelen

Bomen en struiken p.294

Bomen en struiken determineren aan de hand van de bladeren:



Naald- of schubvormige bladeren p.296

Ongedeelde bladeren met gladde rand p.306

Ongedeelde bladeren met getande of gezaagde rand p.322

Gelobde bladeren p.341

Uit meerdere blaadjes samengestelde bladeren p.349

Bloemen, kruiden en grassen p.360

Bloemen determineren aan de hand van de bloemkleur:



Rode bloemen p.362

Witte bloemen p.388

Blauwe bloemen p.418

Gele bloemen p.440

Groene of opvallende bloemen p.478

Grassen p.490



Varens, mossen en dergelijke p.498

Paddenstoelen p.510